



Радиодиагностический центр с ультразвуковой диагностикой и
радиоизотопной лабораторией.

Телефон: 8(3012) 43-76-44

Сцинтиграфия

1. **Сцинтиграфия костей скелета** - специальной подготовки не требуется; исследование проводится через 3 часа после введения радиофармпрепарата (РФП).

2. **Сцинтиграфия щитовидной железы** - подготовка к проведению:

Для получения достоверных результатов за 2-3 месяца до исследования необходимо исключить контакты с йодсодержащими веществами:

- различные БАДы (йодактив, йодомарин и др.); поливитамины содержащие йод;
- рентгеноконтрастные препараты (проведение рентгеновских исследований с контрастом, МРТ или КТ с контрастным усилением);
- препараты для лечения заболеваний горла и носа: раствор Люголя, «Йокс», «Протаргол» и др.; применение спиртового раствора йода на кожу;
- ограничить употребление богатых йодом продуктов питания: морская рыба, морепродукты, хурма, фейхоа.
- снотворные и седативные; препараты – калий иодид, кордарон.
- гормональные (тиреоидные, гипофизарные, половые, кортикостероиды);
- антитиреоидные препараты (тирозол, мерказолил).

Прием данных препаратов по возможности необходимо ограничить за 2 недели до исследования.

3. **Сцинтиграфия миокарда** (продолжительность процедуры составляет 3,5 часа) - подготовка:

- исследование проводится строго натощак, при себе иметь сметану 20%- 250 мл или йогурт;
- за двое суток необходимо отменить прием препаратов из группы бета-блокаторов и блокаторов кальциевых каналов. Проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу отмены приема препаратов;
- за сутки до сцинтиграфии исключите из рациона продукты, содержащие кофеин: шоколад, кофе, чай, кока-колу.

4. **Сцинтиграфия паращитовидных желез** (продолжительность исследования 2,5 часа) - показания к проведению: наличие повышенного уровня паратиреоидного гормона и/или кальция в крови.

5. **Динамическая сцинтиграфия печени, желчевыводящих протоков и желчного пузыря** (продолжительность исследования 2 часа) - подготовка:

- исследование проводится натощак (голод не менее 6-ти часов) с применением желчегонного завтрака. С собой иметь сливки 10% - 200 мл.

6. **Статическая сцинтиграфия печени и селезенки** - специальной подготовки не требуется.

7. **Перфузионная сцинтиграфия легких** - специальной подготовки не требуется.

8. **Динамическая нефросцинтиграфия** - подготовка к исследованию:

- для корректной оценки функционального состояния почек, исследование проводится не натощак, после привычного завтрака;
- водная нагрузка (количество выпитой жидкости) должно быть близким к привычному для пациента, без применения мочегонных препаратов.

9. **Сцинтиграфия желудка** - подготовка: исследование проводится натощак (голод не менее 6-ти часов).

10. **Сторожевые лимфоузлы** - подготовки перед проведением данной процедуры не требуется.

11. **Сцинтиграфия лимфатических узлов** - подготовки перед проведением данной процедуры нет, но имеется специфика введения радиофармпрепарата (РФП) в межпальцевое пространство стоп с обеих сторон. Требуется гигиена стоп и удобная одежда (лосины).

Противопоказания - единственным абсолютным противопоказанием для проведения всех радиоизотопных исследований является беременность.

Кормление грудью является относительным противопоказанием. Кормящим матерям рекомендуют заблаговременно сцеживать грудное молоко и использовать его для кормления ребенка в течение первых двух суток после сцинтиграфии. Ограничение по весу - 130 кг.